

- 1). Rp.: Sol. Novocaini 2% – 5 ml
D.t.d. N 10 in ampull.
S. Для проводниковой анестезии.
#
- 2). Rp.: Sol. Novocaini 0,5% – 5 ml
D.t.d. N 10 in ampull.
S. Для инфильтрационной анестезии.
#
- 3). Rp.: Sol. Trimecaini 2% – 5 ml
D.t.d. N 10 in ampull.
S. Для проводниковой анестезии.
#
- 4). Rp.: Sol. Lidocaini 2% – 5 ml
D.t.d. N 10 in ampull.
S. Для проводниковой анестезии.
#
- 5). Rp.: Sol. Hostacaini 0,5 % – 5 ml
D.t.d. N 10 in ampull.
S. Для инфильтрационной анестезии.
#
- 6). Rp.: Sol. Xylonesti 1% – 50 ml
D. S. Для инфильтрационной анестезии..
#
- 7). Rp.: Sol. Articaini 4 % – 1,8 ml
D.t.d. N 10 in ampull.
S. Для проводниковой анестезии.
#
- 8). Rp.: Sol. Мepivacaini 3% – 1,8 ml
D.t.d. N 10 in ampull.
S. Для проводниковой анестезии.
#
- 9). Rp.: Sol. Bupivacaini 0,75% – 1,8 ml
D.t.d. N 10 in ampull.
S. Для инфильтрационной анестезии.
#

- 10). Rp.: Sol. Duranesti 1,5% – 1,8 ml
D.t.d. N 10 in ampull.
S. Для проводниковой анестезии.
#
- 11). Rp.: Sol. Gentamycini sulfatis 4% – 1 ml
D.t.d. N 20 in ampull.
S. По 1 мл 2 раза в день в\м в течении 7-10 дней..
#
- 12). Rp.: Methicillini- natrii 1,0
D.t.d. N 10
S. Растворить в 1,5 мл стерильной воды перед употреблением:
вводить внутримышечно каждые 4-6 часов..
#
- 13). Rp.: Tab. Ampicillini 0,25 N 20
D.S. Внутрь по одной таблетке через каждые
4-6 часов в течении 1-3 недель.
#
- 14). Rp.: Sol. Lincomycini hydrochloridi 30% – 1 ml
D.t.d. N 20 in ampull.
S. Внутримышечно 3 раза в сутки через 8 часов
в течении 7 дней..
#
- 15). Rp.: Tab. Levamisoli 0,05 N 10
D. S. По одной таблетке 2 раза в день.
#
- 16). Rp.: Cephalexini 0,25
D.t.d. N 30 in caps.
S. По одной капсуле 4 раза в день в течении 1 недели.
#
- 17). Rp.: Cephazolini 0,25
D.t.d. N 20 in lagenis
S. Растворить в 2-2,5 мл воды для инъекций или
в 0,25-0,5 % растворе новокаина; вводить в\м 3 раза
в сутки в течении недели.
#

- 18). Rp.: Sol. Droperidoli 0,25% – 10 ml
D.t.d. N 6 in ampull.
S. За полчаса до операции 1-2 мл в\м, либо 2-5 мл в\в для аналгезии во время операции.
#
- 19). Rp.: Sol. Seduxeni 0,5% – 2 ml
D.t.d. N 10 in ampull.
S. Внутримышечно 2-4 мл.
#
- 20). Rp.: Tab. Andaxini 0,2 N 20
S. По 1 таблетке 3-4 раза в день.
#
- 21). Rp.: Tab. Sulfadimethoxyini 0,5 N 20.
S. По схеме.
#
- 22). Rp.: Sol. Atropini sulfatis 0,1% – 1 ml
D.t.d. N 6 in ampull.
S. По 1 мл. подкожно 1-2 раза в день.
#
- 23). Rp.: Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1% – 2ml
D.t.d. N 10 in ampull.
S. По 1 капле на 10 мл. анестетика для проводниковой анестезии.
#
- 24). Rp.: Sol. Dimedroli 1% – 1 ml
D.t.d. N 10 in ampull.
S. По 1мл подкожно.
#
- 25). Rp.: Sol. Suprastini 2% – 1 ml
D.t.d. N 5 in ampull.
S. По 1-2 мл. 1 раз в день в\м
#
- 26). Rp.: Prednisoloni 3% – 1 ml (30 mg)
D.t.d. N 10 in ampull.
S. Внутривенно капельно или струйно.
#

- 27). Rp.: Sol. Strophantini 0,05% – 1 ml
D.t.d. N 10 in ampull.
S. Вводить в\в медленно 0,5-1 мл., растворив в 20 мл.
40% раствора глюкозы.
#
- 28). Rp.: Lasicis 1% – 2 ml
D.t.d. N 5 in ampull.
S. По 1-4 мл внутримышечно.
#
- 29). Rp.: Trombini sicci 0,001
D.t.d. N 10 in ampull.
S. Содержимое ампулы растворить в 15 мл стерильного
изотонического раствора натрия хлорида.
#
- 30). Rp.: Sol. Acidi aminocapronici 5% – 100 ml
D. S. Внутривенно (капельно).
#
- 31). Rp.: Sol. Vicasoli 1% – 1 ml
D.t.d. N 10 in ampull.
S. Вводить внутримышечно.
#
- 32). Rp.: Haemodesi 500 ml in flaconis
D. S. Для внутривенного (капельного) введения.
#
- 33). Rp.: Polyglucini 400 ml in flaconis
D. S. Для внутривенного введения (капельно).
#
- 34). Rp.: Sol. Lobelini hydrochloridi 1% – 1 ml
D.t.d. N 10 in ampull.
S. По 0,3-0,5 мл внутривенно.
#
- 35). Rp.: Sol. Acidi ascorbinici 5% – 1 ml
D.t.d. N 20 in ampull.
S. По 1 мл внутримышечно 2 раза в день.
#

36). Rp.: Cordiamini 1 ml
D.t.d. N 10 in ampull.
S. По 1 мл внутримышечно 1-2 раза в день.

#

37). Rp.: Sol. Coffeini natrio-benzoatis 10% – 1 ml
D.t.d. N 6 in ampull.
S. По 1 мл 2 раза в день под кожу.

#

38). Rp.: Sol. Chlorhexidini bigluconas 0,5% – 10 ml
D.t.d. N 10 in ampull.
S. Для наружного применения.

#

39). Rp.: Sol. Dioxydini 1% – 10 ml
D.t.d. N 10 in ampull.
S. Для наружного применения.

#

40). Rp.: Sol. Furacilini 1: 5000 400 ml in flaconis
D. S. Для наружного применения.

#

41). Rp.: Sol. Ectericidi 250 ml in flaconis
D. S. Для наружного применения.

#

42). Rp.: Sol. Calypsoli 5% – 10 ml
D.t.d. N 10 in ampull.
S. Для внутримышечного применения из расчета 2мг/кг.